## DİŞE DİŞ ARAŞTIRMA GÜNÜ PROGRAMI

**9.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI**

**10.00** Sabit Restorasyonlara Komşu Daimi Dişlerdeki Interproksimal Çürük Prevalansının Saptanması
*Elif Safalı, Seher Kar, Seda Yıldız, Emir Atakan Gaffaroğlu*

**10.15** Diş Hekimliği Alanındaki Öğrencilerin Mesleki Riskler ve Meslek Hastalıkları Konusundaki Bilgi Düzeyleri
*Merve Paşa, Özlem Şimşek, Ezgi Bakkaloğlu, Ayşe Nur Üredi, Selin Turan*

**10.30** Diş Hekimliği Klinik Öncesi Öğrencilerinin Ergonomik Çalışma Beceri Düzeyleri: Randomize Kontrollü Çalışma
*Muhammet Furkan Kiraz, Abaz Merzhoez, Meryem Şahbaz*

**10.45** Diş Hekimlerinin Ağız Kanserleri Hakkındaki Farkındalığı: Çukurova Bölgesinde Bir Anket Çalışması
*Beyza BÜLBÜL, Mukadder GÜNEY, Alaa ALTURMALI, Selimcan SATAR*

**11.00 ARA**

**11.15** Ev Tipi Beyazlatma Maddesi İle Renk Değişiminin Spektrofotometrik Değerlendirilmesi
*Sülin Küçükdüveyki, Nagehan Türkmen, Zeyna Altay, Elif Türk, Ebru Turuç*

**11.30** Farklı Uzmanlık Alanlarının Lateral Eksikliği Vakalarında Tedavi Yaklaşımları –Pilot Çalışma
*Şükran Bozdemir, Meliha Uçuk, Tuğçe İldeniz, Zümrüt Arslan*

**11.45** Eğitimin Başındaki ve Sonundaki Diş Hekimliği Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerine İlişkin Bir Ön Çalışma
*Sena Nur Şan, Uygar Özer, Zehra Ekdi, Sevgi Baskak, Oğuzhan Pişgin*

**12.00** Hasta ve Hasta Yakınlarının Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete İlişkin Görüşleri
*Cemile Gönül, Hilal Ateş, Aylin Gizem Altıntaş, Hüseyin Şahutoğlu*

**12.15 ARA**

**12.30 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI – SERTİFİKA TÖRENİ**

**13.00 ÇEKİLİŞ**



### Sabit Restorasyonlara Komşu Daimi Dişlerdeki Interproksimal Çürük Prevalansının Saptanması

Elif SAFALI[1], Seher KAR[1], Seda YILDIZ[2], Emir Atakan GAFFAROĞLU[2]

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Burcu KELEŞ EVLİCE (Ağız Diş ve Çene Radyolojisi AD)

**Amaç:** Bu çalışmanın amacı, Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi kliniğine çeşitli nedenlerle başvuran hastalarda sabit restorasyon komşuluğundaki daimi dişlerde interproksimal çürük görülme sıklığının belirlenmesidir.

**Gereç ve Yöntem:** Üçüncü molar dişleri hariç dolgu, kron/köprü ve dental implant gibi sabit restorasyonlardan en az birisi mevcut olan 451 katılımcı gönüllü olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışmanın etik onayı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği kurulundan alındı. Katılımcıların demografik bilgileri, sistemik durumları, varsa kullandıkları ilaçlar veri toplama formuna kaydedildi. 5.sınıf stajyer öğrenciler ve en az bir öğretim elemanının birlikte yaptığı klinik ve radyolojik muayene sonucunda katılımcılardaki sabit restorasyonun hangi dişte olduğu, yapılma süresi, restorasyon komşuluğundaki dişin interproksimal yüzeyinde çürük olup olmadığı, varsa çürük tespit edilen diş numaraları ve DMFT indeksleri kaydedildi. Katılımcılara ayrıca beslenme ve oral hijyen alışkanlıkları konusunda sorular yöneltildi. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek üzere Pearson ki-kare testi uygulanmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS for Windows Ver.20.0 programı kullanılmıştır. $P<0.05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

**Bulgular:** Çalışmaya katılan 285'i (%63.2) kadın, 166'sı (%36.8) erkek, 451 (ortalama yaş; 39.13±1.48) katılıcımdan 365'inde dolgu (%80.9); 240'ında kron/köprü (%53.2) ve 9'unda dental implant (%2) mevcuttu. Çoğunluğu lise mezunu (%31.7) olan katılımcıların %67.2'sinin herhangi bir sistemik hastalığı yoktu. Sağ üst birinci molar (%38.4) en çok sabit restorasyon yapılmış diş iken sol alt santral diş %1.8 ile en az oranda restore edilmiş dişti. Sabit restorasyon komşuluğundaki daimi dişte interproksimal çürük görülme oranı %49.2 olarak belirlendi. En yüksek oranda interproksimal çürük tespit edilen diş sol alt ikinci molar (%7.1) ve en az oranda interproksimal çürük tespit edilen dişler alt sağ ve sol santrallerdi (%0.4). Cinsiyet ve restorasyonun yapılma zamanı ile komşu dişte interproksimal çürük varlığı ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p<0.05$). Katılımcıların toplam çürük diş sayısı ortalaması 3.78; toplam kaybedilmiş/eksik diş sayısı ortalaması 4.05 ve toplam dolgulu/kronlu diş sayısı ortalaması 6.18 idi. Yemekler arası şekerli yiyecek/içecek tüketimi ile ağızdaki toplam çürük ve toplam interproximal çürük sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardı. Ayrıca toplam interproksimal çürük ve toplam çürük sayısı ile diş ipi kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki varken ara yüz fırçası ve gargara kullanımı ile ilişkisi anlamsızdı ($p<0.05$).